



Chirurgie

GOEDAARDIG OPPERVLAKKIG GEZWEL

Geachte,

Er werd vandaag bij u een "**goedaardig oppervlakkig gezwel**" verwijderd:

- naevus (pigmentgezwel)
- sebuncyste (smeerklier)
- lipoom (vetgezwel)
- lymfekliergezwel
- slagaderbioptie
- borstgezwel

De ingreep gebeurde onder:

algemene verdoving

plaatselijke verdoving

U moet beroep doen op een derde om u naar huis te brengen na een algemene verdoving.

Normaal zijn er geen complicaties te verwachten in de eerste 24 uur.

Simpele pijnstillers moeten voldoende zijn.

Andere medicatie en materiaal voor wondverzorging vindt u in bijgaand voorschrift.

De wonde

1. Op de wonde ligt een gesloten steriel verband:
Dit verband dient dus niet geopend te worden, tenzij het bevuild of bebloed is. Het is een waterbestendig verband waarmee u mag douchen (geen ligbad). Laat de wonde na 3 dagen controleren bij de huisarts.
2. Op de wonde ligt een gesloten steriel verband, doch met een drainage onder het verband.
Deze drainage moet minstens dagen blijven.
Dit verband moet na 24 uur door de huisarts worden nagezien en verversd.
3. Op de wonde ligt een gesloten steriel verband en ernaast is er een buisvormige drain met een reservoir verbonden. Dit verband moet na 24 uur door ons / de huisarts worden nagezien.


De hechtingen dienen meestal na 8 dagen te worden verwijderd.

De uitslag van het eventueel microscopisch onderzoek van het weefsel zal aan uw behandelende geneesheer eerstdaags worden meegedeeld.

DOKTERS

Dr. J. Pil
Dr. R. De Staercke
Dr. L. De Bock
Dr. S. Marcoen

SECRETARIAAT

 055/23 35 95